ESCADARIA CUCAMACUCA

BIODOMUS DA ESCADARIA CUCAMACUCA - B4

Ao longo da Escadaria CucaMacuca há encontrar postos de observação da fauna e flora, denominados BIODOMUS, com referência às espécies mais emblemáticas do território, algumas das quais listadas na Direitva Habitats.

Pinheiro-bravo
(Dirosaphylum leiolepidum L.)

É uma árvore de médio porte, pertencente à família Pinaceae, de folhas de cor verde-escura. Os pinhões pequenos são muito saborosos e são boa fonte de sabor para muitas espécies, como os pequenos mamíferos e as aves. Os ramos de pinheiro-bravo são usados como ninhos pelas aves, que também se alimentam dos insetos que vivem na casca.

Fotografia de Francisco Pinho

Tojo
(Ulex europaeus)

É uma arbusto pertencente à família Fabaceae (Leguminosae). É um dos locais preferidos para ninhos e tocas, refúgio de espécies e fonte de sementes para muitas espécies, como os pequenos mamíferos e as aves. Os ramos de tojo são usados como ninhos pelas aves, que também se alimentam dos insetos que vivem na casca.

Fotografia de Francisco Pinho

Águia-de-asa-estendida
(Buteo buteo)

É uma das aves de rapina mais abundantes na Europa. Tem cerca de 1,5 kg e pode atingir os 1,25 m de envergadura. A maior parte possui uma coloração castanha, mas também como mistura e variações. Pode atingir os 1,25 m de envergadura. A maior parte possui uma coloração castanha, mas também como mistura e variações. Pode também apresentar um padrão semelhante ao do pelo de um gato, no entanto, a cor de fundo é sempre castanha. A parte inferior do corpo é sempre clara e pode variar de cor, desde o branco até o castanho-escuro. Os olhos são castanhos e o bico é cinzento.

Foto: Francisco Pinho

Peto-verde
(Picus viridis)

É o maior pica-paus na Portugal. Apresenta dimorfismo sexual, sendo que o macho apresenta uma mancha vermelha na cabeça e a fêmea não apresenta. Os adultos são com um bigode vermelho, enquanto os dos filhotes são de cor vermelha. Os olhos são castanhos e o bico é cinzento. Os filhotes são cinzentos e não possuem bigodes e a mancha vermelha é menor. O formato do corpo é robusto e pode atingir os 36 cm de comprimento e 200 g de peso. Os machos são maiores e pesados do que as fêmeas. As aves reprodutoras são de cor verde-escura, com uma mancha vermelha na cabeça e um bigode vermelho.

Foto: Francisco Pinho

Lagarto-de-ventre-amarelo
(Lacerta lepida)

É o maior lagarto da fauna nacional, atingindo os 80 cm de comprimento. É fácil de reconhecer, com o seu dorso verde-azul, de cores verdes. As escamas do dorso são tonalas verde. Ocorre quase sempre nas proximidades do solo, em zonas áridas e rodeados de vegetação.

Fotografia de Francisco Pinho

Lagarto-de-dedos-grossos
(Chalcides chalcides)

É semelhante à sua forma corporal, dos seus olhos e outras características, a fim de se tornar, no conjunto, fácil de identificar. Tem o aspecto de um lagarto, tem o pescoço e tronco delgado, como a cabeça e fronte de tamanho, sendo que os membros são reduzidos e não existem dedos, e as orelhas apresentam-se de pequenas e pouco visíveis. Este lagarto pertence à espécie de répteis como Ordem Squamata, Família Scincidae e Gênero Chalcides.

Foto: Francisco Pinho